オオカミバリア実証試験



対象作物 長いも

設置方法 容器に約 10cc入れ、高さ約 1mの位置に取り付け、 8~ 10m間隔で設置

試験結果 圃場ヘイノシシが侵入した形跡は認められない

昨年は定植した長いもを掘り返され、ネットを設置しても効果が無かった。 今年はオオカミバリアとネットを併用しているが、侵入・被害は見られない。





設置方法 容器に約 10cc入れ、高さ約 1mの位置に取り付け、8~ 10m間隔で設置 対象作物 試験結果 圃場へイノシシが侵入した形跡は認められない

コメント 設置する前日まで2日おき位の間隔でりんごの食べ残しが園内に散見されたが 設置後は全く侵入の形跡が無いので効果があったと思う。







設置方法 容器に約 10cc入れ、高さ 60cm, 間隔 8mで 20個設置 対象作物 りんご 試験結果 圃場へシカが侵入した形跡は認められない

シカによる被害が多発したので圃場の周囲にネットを設置しているが侵入もみられていた。 コメント オオカミバリアの設置後は獣が圃場へ侵入した形跡が皆無で非常に高い効果が確認できた。



対象作物 レタス

設置方法 容器に約 10cc入れ、高さ 1m, 間隔約 4mで設置 圃場恵シカが侵入した形跡は認められない 試験結果

コメント シカによる被害が多発し、圃場の周囲にネットを設置しているが 侵入もみられていた。

オオカミバリアの設置後は、シカが圃場へ侵入した形跡が無く 非常に高い効果が確認できた。

設置していないところからの侵入があったが、全て設置する ことによって被害が抑えられた。